

Part – III

## CHEMISTRY

Maximum : 60 Scores

### **General Instructions to Candidates :**

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

### **വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :**

- നിർവ്വിഷ്ട സമയത്തിന് പുറം 15 മിനിറ്റ് ‘കൂർശ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂർശ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിപയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൃതം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപ്രശ്നം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപ്രശ്നം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കൂട്ടല്ലെങ്കിൽ, ചിത്രങ്ങൾ, ശാഫ്റ്റീകൾ, ഏൻഡിവ ഉത്തരപേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്ലിരിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സമലതാ സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- ഗ്രോഗ്രാഫുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്ക്യുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെടുക്കും ഒരു മൂലക്കേം്ടാണിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

**Answer all questions from 1 to 7. Each carries 1 score.**

(7 × 1 = 7)

1. The monomeric unit of natural rubber is \_\_\_\_\_.
2. The weakest reducing agent among the hydrides of group 15 elements is \_\_\_\_\_.
3. The reaction in which an amide is converted into a primary amine by the action of  $\text{Br}_2$  and alcoholic  $\text{NaOH}$  is known as \_\_\_\_\_.
4.  $\text{MnO}_4^-$  and \_\_\_\_\_ are formed by the disproportionation of  $\text{MnO}_4^{2-}$  in acidic medium.
5. In a solution of components 'A' and 'B', at molecular level, A – B interactions are weaker than those between A – A or B – B interactions. Then the type of deviation shown by this solution is called \_\_\_\_\_.
6. Identify the co-ordination compound which can exhibit linkage isomerism, among the following :
  - (a)  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
  - (b)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{SO}_4)]\text{Br}$
  - (c)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{Cl}_2$
  - (d)  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{CoF}_6]$
7. For the reaction,  $2\text{NO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{NO}_{2(g)}$ , the rate law is given as,  
Rate =  $k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$ . The order of the reaction with respect to  $\text{O}_2$  is \_\_\_\_\_.  
*Get the latest Question papers,*

Notes and study resources.

Visit studentmap.in

- പ്രക്രിയയിൽ റബ്രൂഡ് ഫോസ്ഫോഡിയും \_\_\_\_\_ ആണ്.
- 15-ാം ശൂഫ്റ്റ് മുഖക്ക്രമാളുടെ പൊതുഭ്രാഹ്യയുകളിൽ ഏറ്റവും ദുർബ്രാഹ്യമായ നീരോളിക്കാരി \_\_\_\_\_ ആണ്.
- ചേബാഹിബന്ധിയാം ആൽക്കഹോളിക് NaOH എന്തും പ്രവർത്തനപരമായി ഒരു അമൈറ്റ്, ചെപ്പമറ്റി അചിൽ ആയി മാറ്റുന്ന രാസപ്രവർത്തനം \_\_\_\_\_ എന്ന പേരിലിരിയപ്പെട്ടുന്നു.
- അഴു മാധ്യമത്തിൽ  $MnO_4^{2-}$  ഡിസ്ലോപ്പോഷനേഷൻ വിധേയമാക്കുന്നോൾ  $MnO_4^-$  ഉം \_\_\_\_\_ ഉം ഉംഭിക്കുന്നു.
- 'A', 'B' എന്നിവയുടെ ഫായനിയിൽ, തന്മാത്രാതലങ്ങിൽ, A – B തന്മാത്രാതല ബലങ്ങൾ A – A, B – B ബലങ്ങളുകളാണ് ദുർബ്രാഹ്യമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫായനി (പ്രക്രിയയും വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നും) വിളിക്കാം.
- ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ളവയിൽ ലിങ്കേജ് എന്നോമരിനും പ്രക്രിയയും ഉപസംഭ്രാഞ്ചക സംയുക്തം (കോഓർഡിനേഷൻ സംയുക്തം) എന്നതെന്നൊഴുത്തുക :

  - $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$
  - $[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br$
  - $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$
  - $[Cr(NH_3)_6][CoF_6]$

- $2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$  എന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിൽന്നും നിരക്ക് നിയമം, നിരക് =  $k[NO]^2[O_2]$  എന്നാണ്. ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഓർഡർ എന്നത് ഓളിംഗന അടിസ്ഥാനമാക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ \_\_\_\_\_ ആണ്.


**Answer any ten questions from 8 to 20. Each carries 2 scores.**

**(10 × 2 = 20)**

8. Write the chemical equation representing Reimer-Tiemann reaction.

9. What is reverse osmosis ? Write any one of its applications.

10. Identify the products and give the name of the following reaction :



11. Explain Haloform reaction.

12. What is meant by step growth polymerisation ? Give an example.

13. An element crystallizes in F.C.C. manner. What is the length of a side of the unit cell, if the atomic radius of the element is 0.144 nm ?

14. Draw the structure of  $\text{H}_3\text{PO}_2$  and account for its reducing character.

15. 2-Bromobutane is optically active. Explain the stereo-chemical aspect of  $\text{S}_{\text{N}}^1$  reaction of 2-Bromobutane with  $\text{OH}^-$  ions.


Get the latest Question papers,  
Notes and study resources.  
Visit [studentmap.in](http://studentmap.in)

8 കുത്തൻ 20 വരെയുള്ള പോദ്യനാലീൽ ഫ്രേഞ്ചുകില്ലാ 10 ഫ്രെണ്ട്രിന് ഉത്തരവെച്ചുതുക.

2 സ്ക്രൂൾ റിതാ.


(10 × 2 = 20)

8. നീഹർ-ടീമൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളു (പ്രതിനിധിക്കാനു രാസസമവാക്യം എഴുതുക).
9. ഫൈനാണ്ട് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ? ഇതിന്റെ ഫ്രേഞ്ചുകില്ലാ ഒരു പ്രായോഗിക ഉപയോഗം പറിച്ചുതുക.
10. ചുവടെ നട്ടിയിരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിലെ ഉപ്പന്നങ്ങൾ ഫ്രേഞ്ചുക്കണ്ണയെന്നും, രാസപ്രവർത്തനത്തില്ലെങ്കിൽ പേരെന്നും എഴുതുക :



11. 'പാലോഫ്റ്റ' രാസപ്രവർത്തനം ഫ്രൈനാന് വിശദമാക്കുക.
12. സ്റ്റൂപ്പർ ഗ്രോത്ത് പോളിമെററെസിഡ് ഫൂന്റുകൊണ്ടർത്തുക്കുന്നതെങ്കിൽ ? ഒരു മുദ്രാവാക്കാം നൽകുക.
13. ഒരു മുലകം F.C.C. റിതിയിൽ ക്രിസ്റ്റലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മുലകത്തിന്റെ അറ്റോഹിക ശുരൂ 0.144 g/m ആയാൽ, അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെപ്പിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര ?
14.  $\text{H}_3\text{PO}_2$  തെളാത്രയുടെ ഘടന വരെ അതിന്റെ നിരേക്ഷിക്കണം സ്ഥാവരണിന് നിഭാനമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കുക.
15. ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവേറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംയുക്തമാണ് 2-അബോമോബൈഡ്രോഡ്യൻ. ഈ സംയുക്തവും,  $\text{OH}^-$  അഭ്യോണ്ടുമായുള്ള  $\text{S}_{\text{N}}^1$  പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഗുണിത്യോക്കിക്കൽ വശങ്ങൾ വിശദിക്കിക്കുക.

16. Briefly explain the different types of emulsions and give example for each.
17. Give the structural formula and IUPAC name of the product formed by the reaction of propanone with  $\text{CH}_3\text{MgBr}$  in dry ether, followed by hydrolysis.
18. Examine the graph given below. Identify the integrated rate equation and the order of the reaction corresponding to it.



19. How is a primary amine distinguished from a secondary amine using a chemical test?
20. Predict the products obtained by the reaction of 2-methoxy-2-methylpropane with  $\text{HI}$ .

Answer any seven questions from 21 to 29. Each carries 3 scores.

(7 × 3 = 21)


21. Explain the terms, Zeta potential, electro-phoresis and electro-osmosis.
22. The rate constant of a reaction at 293 K is  $1.7 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ . When the temperature is increased by 20 K, the rate constant is increased to  $2.57 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ . Calculate  $E_a$  and A of the reaction.

Get the latest Question papers,  
Notes and study resources.  
Visit [studentmap.in](http://studentmap.in)

16. പിവിയ തരം എമർഷന്റുകളുപെട്ടി ചുരുക്കി വിവരിക്കുക. ഓരോന്നിന്റും ഉദാഹരണം നൽകുക.


17. പ്രൊപ്പനോൺ തന്മാത്ര ഇംഗ്ലീഷ് പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിൽ  $\text{CH}_3\text{MgBr}$  എന്ന സംയൂഹവ്യാഹ്യയി പ്രവർത്തിച്ചേണ്ടി, ജല റിഫ്ലോക്സണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉല്പന്നത്തിന്റെ ഐടനയും IUPAC നാമവും നൽകുക.

18. ചുവടെ വരച്ചിച്ചുള്ള ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ച്, അത് പ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന സമാകലിത്ത നിരക്കു സമവാക്യം (ഇന്ത്രൈഗ്രേറ്റ് നിരക്കു സമവാക്യം) എന്തെന്നും, അതനുസരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഓർഡർ ഫൂട്ടരൈറ്റിംഗ് എഴുതുക.



19. ഒപ്പുമാറി അഥവാ, സെക്കന്റി അഥവാ ഏന്തിവായ ഒരു രാസ പരിശോധനയിലൂടെ എന്നെന്ന വേർത്തിൽചെറിയാം ?
20. 2-മിതേക്സി-2-മിതേക്സിപ്പൊപ്പുയൻ, HI തന്മാത്രയ്യമായി പ്രതിറാവർത്തിക്കുമ്പോഴും ശാക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ പ്രവർച്ചിക്കുക.
- 21 മുതൽ 29 വരെയുള്ള പോദ്യൂണലിൽ എല്ലാക്കിലും 7 എല്ലാത്തിന് ഉത്തരവേണ്ടുതുക, 3 മേഘാർ വിത്തം.  $(7 \times 3 = 21)$
21. സീറ്റ് സൊട്ടുകൾക്കും, ഇലക്ട്രോ-ഹോസിസ്, ഇലക്ട്രോ-ഓസ്മോസിസ് എന്നിവ വിശദമാക്കുക.
22. 293 K താപനിലയിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് സ്ഥിരക്കത്തിന്റെ മുല്യം  $1.7 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$  ആകുന്നു. താപനില 20 K വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിരക്ക് സ്ഥിരം ആണെങ്കിൽ  $2.57 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$  എന്ന മുല്യത്തിലേക്കുണ്ടായും. ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ  $E_a$ , A എന്നിവ കണക്കാക്കുക.

23. Identify A, B and C in the following sequence of reactions :



24. Briefly explain different types of neurologically active drugs and give example for each type.

25. Write any three applications of d- and f- block elements.

26. Give the open chain and ring structures of glucose and account for the existence of glucose in two anomeric forms.

27. A 5% solution (by mass) of cane sugar ( $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ) in water has a freezing point of 271 K. Calculate the freezing point of 5% (by mass) solution of glucose ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) in water. Freezing point of pure water is 273.15 K.

28. Explain the steps involved in the vapour phase refining of Ni and Zr.


29. What are interhalogen compounds ? Which interhalogen compound is used to fluorinate Uranium ? How is it prepared ?

Get the latest Question papers,

Notes and study resources.

Visit [studentmap.in](http://studentmap.in)

23. ചുവരെട പേരിൽനിടക്കുള്ള രാസപ്രവർത്തന ശ്രേണിയിൽ A, B, C എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക :



24. നാലി വ്യൂഹവ്യഥാവി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ രൂപ മരുന്മാരുമുണ്ടായി ചുരുക്കി വിവരിക്കുക. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഉദാഹരണം നൽകുക.
25. d- ബ്ലോക്ക്, f- ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യക്കിലും മൂന്ന് പായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക.
26. ഗ്രൂപ്പോസ്റ്റ് തന്മാത്രയുടെ ഓപ്പുണ്ട് ചെയിൻ, വലയ ഘടനകൾ വരുത്തുക, ഗ്രൂപ്പോസ്റ്റ് രണ്ട് ആനോമറിക് രൂപങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും കാണണ്ട് വിശദമാക്കുക.
27. 5% (by mass) കരിവിൻ പഞ്ചസാര ( $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ) ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ലായനിയുടെ വരാങ്ക 271 K ആണ്. എങ്കിൽ 5% (by mass) ഗ്രൂപ്പോസ്റ്റ് ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) ജലത്തിൽ ലയിച്ചു കിട്ടുന്ന ലായനിയുടെ വരാങ്ക കണക്കാക്കുക. ശുദ്ധജലത്തിന്റെ വരാങ്ക 273.15 K ആകുന്നു.
28. Ni, Zr എന്നിവയുടെ ബാഹ്യതല ശൃംഖലകൾ കണക്കാക്കുക. ശുദ്ധജലത്തിന്റെ വിശദികരിക്കുക.
29. ഏന്താണ് ഇൻഡിഹോലജൻ സംയൂക്തങ്ങൾ ? യുറോസിൽ ഐറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിഹോലജൻ സംയൂക്തം ഏതുണ്ട് ? അത് പ്രകാരം നിർണ്ണിക്കാം ?

**Answer any three questions from 30 to 33. Each carries 4 scores.**

**(3 × 4 = 12)**

30. How can the following conversions be effected ?



**(2)**



**(2)**

31. Diagrammatically represent H<sub>2</sub> – O<sub>2</sub> fuel cell and write the half cell reactions taking place in this cell.

32. What are point defects ? Explain the non-stoichiometric point defects in ionic crystals.

33. (i) With the help of a diagram, give the splitting of d-orbitals of Mn<sup>2+</sup> ion in an octahedral crystal field. **(2)**

(ii) On the basis of crystal field theory, explain why [Mn(H<sub>2</sub>O)<sub>6</sub>]<sup>2+</sup> contains five unpaired electrons while [Mn(CN)<sub>6</sub>]<sup>4-</sup> contains only one unpaired electron. **(2)**

30 മുതൽ 33 വരെയുള്ള പ്രോദ്യോഗിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് 3 ഫ്രൈറ്റ് തന്നിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

4 സ്ക്രൂൾ വിതാം.

(3 × 4 = 12)

30. ചുവരട ചേർത്തിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ എന്നെന്ന സാധ്യമാക്കുമെന്ന് എഴുതുക ?

(i) എത്രോസി —→ പ്ലിറോലൂംതെയൻ

(2)

(ii) ബ്രൂക്ക്-1-ലൂണ് —→ ബ്രൂക്ക്-2-ലൂണ്

(2)

31.  $H_2 - O_2$  ഫ്ലൂവൽ സെസ്റ്റിനെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്ന ചിത്രം വരുത്തുക. ഈ സെസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന അർഥം സൊൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശ്നം.

32. 'പോയിന്റ് ഡിഫക്ചുകൾ' എന്നാലെന്ന്? ആധാണിക ക്രിസ്റ്റലുകളിൽ കണക്കുവരുന്ന ഓണിൻ-ബ്രൂഹകിയോമട്ടിക് (രാസസമമിതിയമല്ലാത്ത) പോയിന്റ് ഡിഫക്ചുകൾ വിശദിക്കിക്കുക.

33. (i) ഒരുപാഠിയിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പിൽഡിൽ,  $Mn^{2+}$  ആധാണിംഗ്രേ ഡ-ഹോഡിറ്റലുകൾക്കും ശാക്കുന്ന ഭിന്നങ്ങൾ ഒരു ചിത്രത്തിംഗ്രേ സഹായരഹാചൽ വ്യക്തമാക്കുക.

(2)

(ii)  $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$  തും ജോഡിയല്ലാത്ത അഞ്ച് ഖുലക്കുടാണുകളുണ്ട്. എന്നാൽ  $[Mn(CN)_6]^{4-}$  തും ജോഡിയല്ലാത്ത ഒരു ഖുലക്കുടാണ് നാലും ഒരു. ഇതിംഗ്രേ കാരണം ക്രിസ്റ്റൽ പിൽഡി സിംഗാത്തിംഗ്രേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദിക്കിക്കുക.

(2)